

全年齢 0歳～成人 ワクチン接種スケジュール

ワクチン名	接種回数	接種時期																																							
		0歳	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	1歳3か月	1歳6か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳 - 59歳				65歳	70歳	75歳
mRNAワクチン 新型コロナ	臨時	[臨時接種推奨期間]																																							
不活化ワクチン B型肝炎	3回 定期	[定期接種の推奨期間]																																							
母子感染予防	3回	[定期接種の推奨期間]																																							
健康保険	3回	①②③④																																							
接種スケジュールは変更になることがありますので、最新情報をご確認ください																																									
生ワクチン ロタウイルス	1価 2回 定期	[定期接種の推奨期間]																																							
5価 3回	定期	[定期接種の推奨期間]																																							
不活化ワクチン ヒブ (インフルエンザ菌b型)	4回 定期	[定期接種の推奨期間]																																							
不活化ワクチン 肺炎球菌 (PCV13)	4回 定期	[定期接種の推奨期間]																																							
不活化ワクチン 肺炎球菌 (PPSV23)	1回 定期	[定期接種の推奨期間]																																							
不活化ワクチン 四種混合 (DPT・IPV:シフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)	4回 定期	①②③④																																							
不活化ワクチン 二種混合 (DT:シフテリア・破傷風)		二種混合(DT) ①																																							
不活化ワクチン 三種混合 (DPT:シフテリア・百日咳・破傷風)		三種混合																																							
不活化ワクチン ポリオ (IPV)		不活化ポリオ																																							
接種間隔 5年以上あける																																									
不活化ワクチン 破傷風トキソイド	3回 任意	[任意接種の推奨期間]																																							
生ワクチン BCG	1回 定期	[定期接種の推奨期間]																																							
生ワクチン 麻しん・風しん (MR)	2回 定期	①②																																							
生ワクチン おたふくかぜ	2回 任意	①②																																							
生ワクチン 水痘 (水疱・带状疱疹)	2回 定期	①②																																							
不活化ワクチン 带状疱疹	2回 任意	[任意接種の推奨期間]																																							
不活化ワクチン 日本脳炎	4回 定期	①②③④																																							
年齢によって定期接種可能																																									
不活化ワクチン インフルエンザ	13歳未満 2回 13歳以上 1回 定期	[定期接種の推奨期間]																																							
不活化ワクチン HPV (ヒトパピローマウイルス)	2価 3回 定期	[定期接種の推奨期間]																																							
	4価 3回 定期	[定期接種の推奨期間]																																							
	9価 9-15歳未満 2回 9歳以上 3回 定期	[定期接種の推奨期間]																																							
接種間隔 60-64歳で決められた基礎疾患のある人は定期接種可能																																									
不活化ワクチン 髄膜炎菌 (4価)	1回 任意 (リスクが高い人2回)	[任意接種の推奨期間]																																							
不活化ワクチン A型肝炎	3回 任意	[任意接種の推奨期間]																																							

不活化ワクチン 不活化ワクチン

生ワクチン 生ワクチン

mRNAワクチン mRNAワクチン

定期 法律に定められた期間で接種した場合は無料 (公費負担)

任意 接種費用は自己負担 (自治体によっては接種費用の助成があります) ですが、ワクチンの必要性は定期と同じです

臨時 無料 (公費負担)

定期接種の推奨期間 (オレンジ色)

定期接種の可能期間 (黄色)

任意接種の推奨期間 (緑色)

任意接種の可能期間 (薄緑色)

臨時接種の推奨期間 (紫色)

一般社団法人
日本プライマリ・ケア連合学会
 Japan Primary Care Association

一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会 (JPCA) / 感染症委員会ワクチンチーム





ワクチン名	接種間隔	対象者・注意事項
新型コロナ	生後6か月-4歳 ①-②の間は3週以上あける ②-③の間は8週以上あける 5歳- ①-②の間は3週以上あける ②-③の間は3か月以上あける	生後6か月以降全年齢接種可能
B型肝炎	①-②の間は4週以上あける、①-③の間は20週以上あける ①生直後 ②生後1か月 ③生後6か月	定期：0歳で3回接種 1歳以上でも未接種の場合は、早めに接種することを推奨 HBs抗原陽性の母親から生まれたHBs抗原陰性の乳児（健康保険適用）
ロタウイルス	生後6週以降、①は生後8週-15週未満を推奨（遅くとも生後14週6日までに開始） ・1価ワクチン：①-②は4週以上あける ・5価ワクチン：①-②-③は4週以上あける	定期：1価ワクチン 生後6週から6か月（24週）までに完了する 定期：5価ワクチン 生後6週から8か月（32週）までに完了する
ヒブ (インフルエンザ菌b型)	・初回接種が生後2か月-6か月：①-②-③の間はそれぞれ27日以上、③-④の間は7か月以上あける。①-③までを12か月までに終了する ・初回接種が生後7か月-11か月：①、②の後は7か月以上あけて③ ・初回接種が1歳-4歳：①のみ	定期：生後2か月以上から5歳の誕生日まで
肺炎球菌 (PCV13)	・初回接種が生後2か月-6か月：①-②-③の間はそれぞれ27日以上あける、③-④の間は60日以上あけて、1歳から1歳3か月で④を接種 ・初回接種が生後7か月-11か月：①、②の接種後60日以上あけて1歳以降に③ ・初回接種が1歳-生後23か月： ①、②を60日以上あける ・初回接種が2歳-4歳：①のみ	定期：生後2か月以上から5歳の誕生日まで 任意：高齢者または肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高い人
肺炎球菌 (PPSV23)	定期： 2023年度末までは65歳以降100歳まで5年ごと（参照：おとなのワクチン）	任意：2歳以上 対象者：(1) 脾臓摘出した人の肺炎球菌予防（健康保険適用）(2) 鎌状赤血球症、脾機能不全、心臓・呼吸器の慢性疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病、慢性髄液漏等の基礎疾患のある人、免疫抑制剤治療予定者（治療開始まで14日以上の余裕のある場合）
四種混合 (DPT-IPV: ジフテリア・百日咳・ 破傷風・ポリオ) 二種混合 (DT:ジフテリア・破傷風) 三種混合 (DPT:ジフテリア・百日咳・破傷風) ポリオ(IPV)	①-②-③の間はそれぞれ20-56日あける ③-④の間は6か月以上あける (標準は③終了後12-18か月の間) 11歳-13歳未満 二種混合 二種混合の代わりに三種混合ワクチンを接種可 (百日咳予防目的)	定期： 1期：生後2か月-7歳半の誕生日まで (四種混合・三種混合・ポリオ) 2期：11歳-13歳の誕生日前日まで（二種混合） 任意（推奨）： ・5歳-7歳未満 三種混合ワクチンを追加接種（百日咳予防目的） 不活化ポリオワクチンを追加接種（ポリオ予防目的） ・不活化ポリオワクチン：ポリオ流行地へ行く人
破傷風 トキソイド	・①のあと3-8週後に②、①の12-18か月後に③ ・10年ごとに1回接種	・過去に3回の接種歴がない人 ・3回接種歴がある人は10年ごとに1回接種 注意：1967年以前の生まれの人は定期接種がありません
BCG		定期：生後12か月未満 標準的には、生後5か月から8か月

ワクチン名	接種間隔	対象者・注意事項
麻しん・風しん (MR)	①：1歳-2歳の誕生日の前日まで ②：5歳-7歳未満 (小学校就学前の1年間)	定期：①1歳、②年長児相当 風しん第5期： 1962年4月2日から1979年4月1日生まれの男性(2024年度末まで) 任意：1歳以降全年齢接種可能 麻疹曝露後や流行地域では、生後6か月以降で接種可能 その場合は接種回数には数えず、①、②は規定通り接種する
おたふくかぜ	①：1歳以降 早期に ②：5歳-7歳未満（小学校就学前の1年間） ①から4週間あければ接種可能	任意：1歳以降全年齢接種可能
水痘 (水痘・帯状疱疹)	1歳-3歳未満： ①：1歳以降 早期に ②：①から3か月以上あける 3歳以上：①-②の間は4週間以上あける	定期：1歳-3歳の誕生日前日まで 任意：1歳以降全年齢接種可能
帯状疱疹	①-②の間は2か月-6か月あける	任意：50歳以上
日本脳炎	①-②の間は6日以上(-28日)あける ②-③の間は6か月以上あける ④：9歳-13歳未満	定期：1期：3歳-7歳6か月 (自治体によっては生後6か月から開始) 2期：9歳以上13歳未満 任意：生後6か月以降全年齢接種可能 2005年5月からの積極的勧奨の差し控えを受け、特定対象者(1995年4月2日から2007年4月1日生まれの人)は、20歳の誕生日前日までは定期接種可能
インフルエンザ	13歳未満：①-②の間は4週(2-4週)あける	任意：生後6か月以上の全年齢 定期：65歳以上(成人のスケジュール参照)
HPV (ヒトパピローマ ウイルス)	①-②の間は1か月以上あける ①-③の間は6か月以上あける 標準的な接種ができなかった場合、①-②の間は1か月以上、①-③の間は5か月以上、かつ②-③の間は2か月半以上あける ①-②の間は2か月以上あける ①-③の間は6か月以上あける 標準的な接種ができなかった場合、①-②の間は1か月以上、②-③の間は3か月以上あける 9価 9-15歳未満：2回でも可、その場合①-②の間は5か月以上あける	2価ワクチン 定期：小学校6年から 高校1年女性 任意：10歳以上の女性 4価・9価ワクチン 定期(4価)(9価)： 小学校6年から高校1年女性 任意(4価)：9歳以上の男女 任意(9価)：9歳以上の女性 キャッチアップ接種 1997年4月2日から2006年4月1日生まれの女性 2022年4月から2025年3月の3年間、HPVワクチン(2価・4価・9価)を定期接種可能
髄膜炎菌 (4価)	リスクが高い人 ①-②の間は8週以上あける	任意：2歳以上 (1) 髄膜炎菌感染症流行地域へ渡航する人 (2) 学校の寮などで集団生活を送る人、送る予定の人 (3) マスギャザリングイベントに参加する人 (4) リスクが高い人(HIV感染症、補体欠損症、無脾症、エクリズムP治療患者など)
A型肝炎	①-②の間は2-4週あける ①-③の間は20-24週以上あける	任意：全年齢接種可能(WHOは1歳以上を推奨) A型肝炎流行地へ渡航する人

